

Doença articular degenerativa em gatos

Artrite felina



Patrocinado por  **Boehringer
Ingelheim**

Doença de junta degenerativa em gatos

Artrite felina

A artrite felina, cujo nome correto é doença articular degenerativa (DAD), é bastante comum em gatos. A cartilagem articular sofre desgaste, causando dor crônica, que pode ser debilitante e levar à piora da qualidade de vida. A dor em gatos com DAD ocorre normalmente na parte posterior das costas, cotovelos, joelhos, quadris, ombros e calcanhares (o equivalente aos nossos tornozelos). Estudos indicam que até 92% dos gatos podem ter DAD. Mesmo gatos jovens podem apresentar DAD, mas ela pode não ser perceptível até piorar com a idade.

SINAIS SUTIS DE DAD

A dor muitas vezes não é percebida nos gatos porque os sinais são sutis. Isso ocorre porque os gatos são caçadores solitários que precisam permanecer saudáveis e fortes para caçar com sucesso e protegerem-se contra predadores e possíveis ameaças. Dessa forma, gatos se escondem ou ocultam sinais de dor ou fraqueza. Você pode pensar que seu gato não precisa se preocupar com caça ou ameaças, mas esse instinto protetor ainda ocorre em todos os gatos.



Os gatos com DAD raramente mancam porque a doença costuma afetar a mesma articulação em ambos os lados (p.e. ambos os joelhos). Isso se difere significativamente da artrite nos cães que podem apresentar mais dor em uma perna, mancando de forma perceptível. O desconforto no caminhar também é mais facilmente reconhecido em cães porque costumam ser levados para sair.




COMO POSSO SABER SE MEU GATO TEM DAD?

Você tem um papel muito importante na identificação dos sinais de DAD em seu gato, já que conhece melhor do que todos seu temperamento normal, rotinas e atividades. Qualquer mudança no comportamento do seu gato pode ser um sinal de dor. Para identificar mudanças, compare os comportamentos diários e reações do seu gato em diversas situações com quando eram jovens adultos. Quaisquer mudanças no comportamento normal do seu gato pode significar que ele está com dor, doente ou estressado — todas essas


sendo razões para buscar cuidados veterinários.

Se o seu gato apresentar qualquer um dos sinais a seguir, entre em contato com um veterinário imediatamente.


- Diminuição na atividade de pulos ou não conseguir pular tão alto quanto antes
- Dificuldade ou hesitação para subir ou descer escadas; caminhar por escadas com lentidão
- Corpo mais rígido
- Animal menos ativo e brincalhão
- Comportamento mais fechado, evitando contato ou maior dependência
- Redução ou excesso de autolimpeza em uma área dolorida
- Agressividade quando manipulado ou com outro animal
- Eliminação inapropriada (não usa a caixa de areia para urina e/ou fezes)




Gatos com artrite podem usar uma cadeira para ajudar a pular na mesa.



Gatos com artrite brincam menos e passam mais tempo dormindo.



Gatos com artrite podem hesitar em subir escadas.



Gatos com artrite podem hesitar em pular de uma mesa.

CONTROLE DA DOR NA DAD



Há excelentes tratamentos para essa condição, então, não demore para entrar em contato com um veterinário se perceber quaisquer sinais. **NUNCA dê nenhum medicamento ao seu gato sem orientação de um veterinário, incluindo medicamentos de venda livre, como ibuprofeno (isso é, Advil), acetaminofeno (ou seja, Tylenol) ou aspirina.** Muitos desses

medicamentos podem ser fatais para gatos.

Depois que um diagnóstico é feito, seu veterinário vai ajudá-lo a desenvolver um tratamento para o seu gato. O tratamento inclui medicamentos e simples mudanças em casa, permitindo que seu gato mantenha seus comportamentos normais.

Para obter mais informações sobre a doença articular degenerativa e controle de dor, acesse www.catfriendly.com/djd.

Você é um membro importante na equipe de saúde do seu gato. Você é essencial para ajudar no sucesso dos tratamentos e na saúde do seu gato.

Agradecemos à Boehringer Ingelheim por patrocinar este documento.



Apoiado por:



www.catvets.com