

TRATAMIENTO DEL DOLOR DE DJD



Existen tratamientos excelentes para esta condición, así que no demore en ponerse en contacto con el consultorio veterinario si nota cualquier síntoma. **NUNCA le dé a su gato ningún medicamento sin asesoría de su veterinario, incluidos los medicamentos de venta libre como ibuprofeno (por ejemplo, Advil o Motrin), paracetamol (por ejemplo, Tylenol) o aspirina.** Muchos de estos medicamentos

pueden ser mortales para los gatos.

Una vez que se realiza un diagnóstico, el veterinario lo ayudará a elaborar un plan de tratamiento para su gato. El tratamiento incluye tanto la medicación como los cambios simples en el hogar para permitir que su gato mantenga sus comportamientos normales.

Para obtener más información sobre la enfermedad articular degenerativa y el tratamiento del dolor, visite www.catfriendly.com/djd.

Usted es un miembro importante del equipo de atención médica de su gato. Usted es fundamental para ayudar con el éxito de los tratamientos y la atención médica de su gato.

Queremos agradecer a Boehringer Ingelheim por patrocinar este documento.



Promocionado por:



www.catvets.com

Este folleto ha sido desarrollado a partir de las Normas de tratamiento de dolor para perros y gatos de AAFP/AAHA 2015.
© 2017 AAFP. Todos los derechos reservados.

Enfermedad articular degenerativa en gatos

Artritis felina



Patrocinado por  Boehringer Ingelheim

Enfermedad articular degenerativa en gatos

Artritis felina

La artritis felina, más correctamente denominada enfermedad articular degenerativa (DJD), es muy común en los gatos. El cartilago dentro de la articulación se desgasta, lo que produce dolor crónico, que puede ser debilitador y llevar a una mala calidad de vida. El dolor en los gatos con DJD sucede más comúnmente en la espalda baja, codos, rodillas, caderas, hombros y jarretes (el equivalente a nuestros tobillos). Los estudios indican que un 92% de los gatos pueden tener DJD. Incluso los gatos jóvenes pueden tener DJD, pero puede que no sea tan notorio hasta que empeore con la edad.

SÍNTOMAS SUTILES DE DJD

El dolor suele pasar desapercibido en los gatos porque los síntomas son sutiles. Esto se debe a que los gatos son cazadores solitarios que deben permanecer saludables y fuertes para poder cazar de manera exitosa y protegerse a sí mismos de predadores y presuntas amenazas. Por lo tanto, los gatos ocultan los síntomas de dolor o debilidad. Usted puede pensar que su gato no necesita preocuparse por cazar o las amenazas, pero este instinto protector todavía existe en todos los gatos.



Los gatos con DJD raramente cojean porque la enfermedad suele impactar la misma articulación en ambos lados (por ejemplo, ambas rodillas). Esto se distingue enormemente de la artritis en los perros, que muestran más dolor en una pata, por lo que tienen una cojera más notable. La incomodidad al caminar es mucho más fácil de reconocer en los perros porque normalmente se los saca a caminar afuera.




¿CÓMO PUEDO DARME CUENTA SI MI GATO TIENE DJD?

Usted desempeña una función muy importante en la identificación de los síntomas de DJD en su gato porque conoce mejor que nadie su temperamento, rutinas y actividades normales. Cualquier cambio en el comportamiento normal de su gato puede ser un síntoma de dolor. Para identificar cambios, compare el comportamiento y las reacciones diarias de su gato en varias situaciones a los de cuando era un adulto joven.


Cualquier cambio en el comportamiento normal de su gato puede significar que tiene dolor, está enfermo o estresado. Todos son motivos para buscar atención veterinaria.

Si su gato muestra cualquiera de los siguientes cambios, contacte a su veterinario inmediatamente.


- Disminución al saltar hacia arriba o abajo o no saltar tan alto como antes
- Dificultad o duda al subir o bajar las escaleras, sube o baja las escaleras con más lentitud
- Rigidez
- Menos activo y juguetón
- Se marcha, esconde o aumento de apego
- Disminución del aseo o aumento del aseo en el área con dolor
- Agresivo cuando se lo agarra o hacia otra mascota
- Ensucia la casa (no usa la caja de arena para la orina y/o excrementos)




Puede que los gatos con artritis usen una silla para ayudarse a saltar a la mesa.



Los gatos con artritis juegan con menos frecuencia y pasan más tiempo durmiendo.



Puede que los gatos con artritis duden al subir las escaleras.



Puede que los gatos con artritis duden al bajarse de la mesa.