

Le traitement de la douleur (AINS) et votre chat

Un « anti-douleur » appelé « anti-inflammatoire non stéroïdien » (ou AINS) a été prescrit pour votre chat. Ces médicaments sont couramment utilisés chez l'Homme et les animaux pour aider à soulager la douleur, la fièvre et l'inflammation, souvent associées à l'arthrose. Le contrôle de la douleur est indispensable au bien-être de votre chat. De nombreux chats profitent des bienfaits de ces médicaments, qui améliorent leur mobilité, soulagent leur douleur, augmentent leur appétit et améliorent leur qualité de vie.

L'arthrose chez le chat

L'arthrose est fréquente, notamment chez les chats âgés. Comme pour d'autres maladies, les chats peuvent en dissimuler les signes.

Les problèmes et modifications du comportement liés à l'arthrose chez le chat incluent :

- ➔ **La baisse d'activité** – par ex. l'animal dort plus, ne bouge plus autant, joue ou chasse moins
- ➔ **La baisse de mobilité** – par ex. l'animal hésite à sauter, ne saute plus aussi haut, a des difficultés à utiliser la litière, est raide, et boite parfois franchement
- ➔ **La diminution du toilettage** – l'animal passe moins de temps ou a du mal à faire sa toilette, a un pelage en mauvais état, des griffes trop longues
- ➔ **Les modifications de la personnalité** – l'animal interagit moins avec la famille ou les autres animaux, recherche la solitude, est « grognon »
- ➔ **D'autres signes** – entre autres, l'animal peut être agressif ou gémir quand on le touche, ou perdre l'appétit

Connaître ces signes vous aidera, vous et votre vétérinaire, à repérer une éventuelle douleur et de l'arthrose, et vous aidera à évaluer l'utilité du traitement.

Les AINS sont-ils sûrs chez le chat ?

Les AINS jouent un rôle essentiel dans le traitement de nombreux chats, mais du fait des différences existant entre les chats et les autres animaux, vous ne devez utiliser un médicament que s'il a été prescrit spécifiquement pour votre animal par votre vétérinaire. Plusieurs médicaments humains comme l'aspirine, l'ibuprofène et le paracétamol/acétaminophène peuvent s'avérer très toxiques chez le chat – les utiliser peut mettre en danger la vie de votre animal. Des effets indésirables peuvent être observés avec les AINS, comme avec tous les médicaments. Certains individus peuvent présenter un risque accru d'effets indésirables (par ex. chats âgés, chats atteints de certaines maladies). Votre vétérinaire peut alors recommander un suivi plus étroit et un ajustement minutieux du traitement afin d'utiliser la plus petite dose efficace pour votre chat.




A quels effets indésirables dois-je faire particulièrement attention ?

Les AINS enregistrés ont démontré leur sécurité d'emploi chez le chat. Toutefois, des effets indésirables peuvent toujours se produire. La plupart sont légers, mais certains peuvent être graves – comme dans les autres espèces, ils peuvent concerner l'appareil digestif, les reins, le système cardiovasculaire ou le foie. Les effets indésirables peuvent se manifester par un certain nombre de signes, dont :

- ➔ La perte d'appétit
- ➔ Les nausées ou vomissements
- ➔ La léthargie et l'ennui/la dépression
- ➔ La modification de la consommation d'eau et/ou du volume urinaire
- ➔ La diarrhée et/ou des selles noires
- ➔ Le jaunissement de la peau, des gencives ou du blanc des yeux

Que faut-il que je sache ?

- ✓ Assurez-vous d'avoir bien compris quelle quantité de médicament vous devez donner, à quelle fréquence et pendant combien de temps. Si vous n'êtes pas sûr, demandez confirmation à votre vétérinaire.
- ✓ Donnez toujours le médicament avec ou après un repas. Votre vétérinaire peut vous suggérer de donner des boîtes plutôt que des croquettes pour favoriser la consommation d'eau de votre chat, car il est important de maintenir un apport hydrique suffisant.
- ✓ Si votre chat ne mange pas, ne lui donnez PAS le médicament. Contactez votre vétérinaire.
- ✓ Discutez avec votre vétérinaire du type de suivi qui doit être réalisé pour assurer la sécurité de votre chat – à quelle fréquence votre chat doit-il être réexaminé, quelles analyses sanguines et urinaires faut-il effectuer, et à quelle fréquence.
- ✓ Ne donnez jamais à votre chat un autre médicament en même temps sans en parler au préalable avec votre vétérinaire.
- ✓ A tout moment, si vous avez une inquiétude, ou si vous observez des effets indésirables potentiels, CESSEZ le traitement et contactez immédiatement votre vétérinaire.



Sécurité d'abord : Si vous avez le moindre doute, CESSEZ le traitement et CONTACTEZ votre vétérinaire